

复方血竭散对鼻腔术后黏膜修复的 疗效观察^{*}

刘莉萍^{**} 侯 薇 李 菁 苏 涛 徐 芳

(陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000)

摘 要:目的 观察运用复方血竭散创面贴敷治疗经鼻内窥镜行鼻腔术后的疗效。方法 对照组 60 例行鼻内窥镜鼻中隔矫正术、双下鼻甲部分切除术后配合凡士林纱片创面贴敷;治疗组 60 例行鼻内窥镜鼻中隔矫正术、双下鼻甲部分切除术后,在对照组的基础上联合复方血竭散创面贴敷。结果 治疗组和对照组术后第 3、5、7、9、11、13、15 天各项指标比较差异有显著性差异($P<0.05$);术后 3 个月经鼻内窥镜检查,所有患者鼻中隔黏膜、双侧下鼻甲黏膜光滑,鼻通气畅,治疗组明显优于对照组。结论 鼻内窥镜鼻中隔矫正术、双下鼻甲部分切除术联合复方血竭散创面贴敷治疗疗效满意,中药创面贴敷在促进黏膜恢复方面明显优于凡士林纱片。

关键词:慢性鼻炎;鼻中隔偏曲;鼻内镜术后;复方血竭散;鼻腔贴敷

中图分类号: R 765 文献标识码: A 文章编号: 1672-0571(2017)01-0039-03

DOI:10. 13424/j. cnki. mtem. 2017. 01. 016

以全身疾病为治疗目的的中药鼻腔给药具有悠久的历史,近年来中药鼻腔给药的临床应用发展迅速。我们对本院 2014 年 9 月~2015 年 12 月采用内窥镜下行鼻中隔偏曲矫正术、双中下鼻甲部分切除术的患者,术后用中药复方血竭散^[1]散布在凡士林纱片上贴敷创面治疗,取得良好疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 患者均为鼻中隔偏曲、慢性鼻炎,部分有慢性鼻窦炎^[10]。均经保守治疗效果不明显,并反复发作,长期鼻塞、流粘涕、头痛、出血,部分患者伴有嗅觉减退、张口呼吸、流脓涕等症。治疗组:为复方血竭散组,60 例中男性 41 例,女性 19 例。病程最短者半年,最长者 21 年。经鼻内窥镜在局麻下行鼻中隔偏曲矫正术、双下鼻甲部分切除术,有慢性鼻窦炎者均行开放术,清除病变。对照组:为凡士林纱片组,60 例中男性 28 例,女性

32 例,病程最短者 4 个月,最长者 17 年。同样行上述手术。

1.2 治疗方法 将临床符合标准的住院手术后病人 120 例完全按住院顺序编号从 1 号到 120 号,在电子计算机上应用 Excel 产生随机数,并按 1:1 比例随机分为两组,每组 60 例。治疗组:应用复方血竭散在鼻腔术后第 2 天取出鼻腔填塞的止血纱条,将复方血竭散适量均匀散布于同对照组尺寸相同的凡士林纱条表面,贴敷于鼻腔创面,每日 1 次,连续 15 天。对照组:应用长 4.5 cm、宽 1.5 cm 的双层凡士林纱条。同样在鼻腔术后第 2 天,将双层凡士林纱条贴敷于鼻腔创面,每日 1 次,连续 15 天。治疗组、对照组病人治疗前均行常规术前准备、手术及术后配合运用敏感抗生素静滴或口服,防止感染;观察期间若出现感冒及其他病变,均做相应处理。1、2 疗程后两组分别行行鼻内镜检查,观察黏膜变化。然后进行组内治疗前、后比较,组间治

* 基金项目:陕西中医药大学附属医院院内制剂研究课题(2014-47)

** 通讯作者:刘莉萍(1975-),主治医师,研究方向:复方血竭散对鼻腔术后粘膜修复的临床研究。E-mail:1075986860@qq. com