

# 止痛如神汤加洗必泰痔疮栓治疗 肛窦炎疗效观察

耿少民<sup>1</sup> 王立馨<sup>1</sup> 邓云权<sup>2\*</sup>

(1. 西安市北方医院肛肠科, 陕西 西安 710043; 2. 韩城市妇幼保健院, 陕西 韩城 715400)

**摘要:**目的 探讨止痛如神汤加洗必泰痔疮栓治疗肛窦炎的临床疗效。方法 以我科十年来所收治 240 例肛窦炎患者为研究对象, 将患者随机分为对照组和治疗组, 对照组患者行单纯的洗必泰痔疮栓治疗, 治疗组患者在此基础上应用止痛如神汤进行治疗, 对比分析两组患者的临床疗效。结果 实验组患者治疗的总有效率为 92.5%, 治疗组患者治疗的总有效率为 78.3%, 临床症状(疼痛、坠胀、潮湿、水肿)缓解时间、两组患者的实验数据对比具有显著的统计学差异。结论 止痛如神汤加洗必泰痔疮栓治疗肛窦炎, 具有满意的临床疗效。

**关键词:**肛窦炎; 止痛如神汤; 洗必泰

中图分类号: R 657.1 文献标识码: B 文章编号: 1672-0571(2017)03-0059-02

DOI: 10.13424/j.cnki.mtcm.2017.06.022

肛窦炎是肛肠科常见疾病之一, 是肛窦部位出现的急慢性炎症, 是肛周化脓性疾病的重要诱因。笔者近年来应用止痛如神汤加洗必泰栓用于肛窦炎治疗, 取得了良好的疗效。

## 1 资料与方法

**1.1 一般资料** 240 例患者均为我院肛肠科门诊 2006 年 5 月~2017 年 5 月就诊的患者。将患者随机分为对照组及治疗组, 每组 120 例。对照组男 51 例, 女 69 例; 年龄 18~74 岁, 平均年龄为 (46.28±10.26) 岁。治疗组男 56 例, 女 64 例; 年龄 20~72 岁, 平均年龄为 (45.39±11.31) 岁。在性别、年龄等方面两组患者无统计学差异, 具有可比性 ( $P>0.05$ )。

**1.2 诊断标准** 参照《中西医临床肛肠病学》<sup>[1]</sup> 和《中医病证诊断疗效标准》<sup>[2]</sup>: ①临床症状: 肛门疼痛、坠胀及排便不尽感, 大便带黏液, 伴肛周瘙痒、会阴部不适等(具有 1 项或多项); ②指征: 病变肛窦处可触及硬结或凹陷, 肛瓣隆起, 触痛明显; ③肛镜检查: 镜下可见到肛窦、肛门瓣充血、水肿, 轻压病窦处可见有黏液或脓性分泌物溢出, 可伴旁侧肛乳头红肿肥大。

**1.3 纳入标准** 符合肛窦炎诊断标准及病程为 2

周以上, 且年龄在 18~80 岁之间的患者。

**1.4 排除标准** ①合并严重的心、脑血管病; 肝、肾功能不全; 精神病、血液病、糖尿病以及肿瘤病患者; ②合并肛裂、肛瘘、肛周脓肿等肛周疾病; ③孕妇及哺乳期妇女; ④对使用本药物过敏者。

**1.5 治疗方法** 对照组单独使用洗必泰痔疮栓纳肛, 1 枚(规格为每枚 1.5g)/次, 2 次/日; 治疗组同时口服止痛如神汤(苍术、皂角、秦艽各 12g, 黄柏、泽泻、桃仁、槟榔各 10g, 当归、防风各 15g, 熟大黄 6g)水煎, 浓煎至 400 mL, 分早晚两次饭后温服, 1 d 剂, 疗程 15 d。

**1.6 疗效标准** 参照《中医病症诊断疗效标准》<sup>[2]</sup>: 治愈, 患者各项临床症状完全消失, 肛肠镜检查体征无异常; 显效, 患者肛门偶有里急后重感、肿痛或重坠, 体征检查无明显异常; 好转, 患者肛门各项临床症状及体征较前减轻; 无效, 患者各项临床症状及体征无任何减轻, 甚至加重。

**1.7 统计学方法** 使用 SPS17.0 统计学软件。均数±标准差 ( $\bar{x} \pm s$ ) 表示(采用  $t$  检验)计量资料, 卡方 ( $\chi^2$ ) 检验及秩和检验 ( $P<0.05$  为差异)有统计学意义。

\* 通讯作者: 邓云权(1966-), 男, 副主任医师, 主要研究方向: 心脑血管疾病。E-mail: 505362496@qq.com