

醒神愈痫汤治疗小儿癫痫临床疗效观察

张秀红

(林州市人民医院,河南 林州 456550)

摘要:目的 探讨中药醒神愈痫汤对小儿癫痫患者的治疗效果,并分析对不良反应的改善作用。方法 选取我院在 2015 年 10 月~2017 年 6 月收治的癫痫患儿 190 例,按照随机方法将其分为对照组(95 例)和治疗组(95 例),对所有患儿均采用常规抗癫痫的治疗方式,治疗组则在此基础上采用中药醒神愈痫汤进行进一步治疗,分析两组患者的临床治疗效果以及不良反应,并进行比较。结果 治疗组患儿治疗总有效率为 95.79%,对照组患儿治疗总有效率为 76.84%,即治疗组患儿治疗总有效率明显高于对照组($P<0.05$);治疗组患儿不良反应出现率为 7.37%,对照组患儿不良反应出现率 16.84%,即治疗组患儿不良反应出现率明显低于对照组($P<0.05$)。结论 对于小儿癫痫患者,在进行常规癫痫治疗中可采取中药醒神愈痫汤进行治疗,可获得显著治疗效果,明显改善患儿不良反应,具有较高临床使用并推广的价值。

关键词:小儿癫痫;中药醒神愈痫汤;中西医结合

中图分类号:R748 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-0571(2019)05-0051-04

DOI:10.13424/j.cnki.mtem.2019.05.016

癫痫在小儿中出现的原因主要是其神经系统发育不完善,在刺激大脑皮层的过程中容易出现异常的放电现象,且小儿癫痫的发病率较高,临床表现症状包括肌肉抽搐、感觉、情感和意识等方面出现短暂异常。对于小儿癫痫患者来说,对其采用合理的治疗方式具有重大意义,通常情况下临床会采用西药治疗,但治疗效果并不佳,同时会导致患儿出现不良并发症,不利于其预后和正常恢复。因此,本文研究对我院小儿癫痫患者采取了中药联合治疗方法,探讨此治疗方式为患儿产生的作用,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 以 2015 年 10 月~2017 年 6 月我院住院治疗的 190 例癫痫患儿为研究对象,在入院时均进行相关诊断,符合耐心药性癫痫症状,其中并不存在合并严重器官如心肝肾等疾病患儿,且其家属均签订本次研究知情书。将所有患儿依照随机方法分为两组,其中对照组 95 例中,男性患儿有 51 例,女性 44 例;年龄在 6 个月~23 个月,平均(9.15 ± 1.21)个月;病程在 1d~3 个月,平均(1.15 ± 0.03)个月。治疗组 95 例患儿中,男性 53 例,女性 42 例,年龄 5 个月~24 个月,平均($9.58 \pm$

1.23)个月;病程在 2d~3 个月,平均(1.22 ± 0.05)个月。两组患儿在年龄、性别等一般资料的比较,均无显著差异($P>0.05$),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 本组患儿的治疗使用的是常规抗癫痫,对患儿的癫痫症状进行评价,并依照评价的结果选择合适的药物进行治疗,整个治疗中药物的使用尽量保持单一性,最大限度的避免药物之间产生不良相互作用,对患儿的疗效产生不良影响。

1.2.2 治疗组 在对照组患儿的治疗基础上,采用中药进行治疗,实施中药醒神愈痫汤的治疗手段,药方:天麻 12g,黄芩 12g,郁金 9g,龙胆草 12g,钩藤 18g,麦冬 12g,茯苓 12g,生石决明 15g,丹参 12g,红花 12g 清水进行煎服,取汁 400mL 为 1 剂,每天服用 1 剂,且分成早晚两次服用,每次服用 200mL。

1.3 疗效评定 ①治疗效果,显效:在治疗 2 个月后患儿均为出现癫痫发作情况;有效:治疗后患儿癫痫发作次数降低 60% 以上;无效:以上两种标准均未达到,甚至出现严重情况;治疗有效率 = 显效率 + 有效率;②不良反应,包括嗜睡、体重增加、胃