

益消复瘫汤与补阳还五汤治疗 脑梗死合并2型糖尿病的疗效对比

刘利新¹ 袁武龙^{2*}

(1. 佳县人民医院, 陕西 佳县 719299; 2. 陇县妇幼保健院, 陕西 陇县 721200)

摘要:目的 分析探讨益消复瘫汤与补阳还五汤治疗脑梗死合并2型糖尿病的疗效。方法 选取我院于2015年5月~2018年5月期间收治的135例脑梗死合并2型糖尿病患者,所有患者均给予常规的内科对症治疗,按照随机数字表法将所有患者简单随机分为对照组和治疗组两组,其中试验组联合使用益消复瘫汤进行治疗,而对照组患者则给予补阳还五汤进行治疗,所有患者均持续治疗8周。根据临床观察量表记录两组患者的中医证候积分,比较两组患者的日常生活活动能力和认知功能障碍水平以及神经功能缺损水平等。结果 两组患者治疗前的中医证候积分、神经功能缺损评分、认知功能障碍水平以及日常生活活动能力均无明显差异(均 $P > 0.05$);两组患者治疗后的中医证候积分、神经功能缺损评分、认知功能障碍水平以及日常生活活动能力均显著优于本组治疗前(均 $P < 0.05$);治疗组患者治疗后的中医证候积分、神经功能缺损评分、认知功能障碍水平以及日常生活活动能力均显著优于同期对照组患者(均 $P < 0.05$)。两组患者治疗前的生活质量评分并无明显差异(均 $P > 0.05$);经过治疗后,治疗组患者的生活质量评分均显著优于同期对照组患者(均 $P < 0.05$)。结论 对脑梗死合并2型糖尿病患者使用益消复瘫汤进行治疗能够有效改善患者的生活质量,疗效显著,值得在临床上加以推广运用。

关键词: 糖尿病; 脑梗死; 益消复瘫汤; 补阳还五汤; 临床疗效

中图分类号: R255.2 文献标识码: B 文章编号: 1672-0571(2019)02-0084-04

DOI: 10.13424/j.cnki.mtcm.2019.02.026

Comparison of Yixiao Futan Decoction and Buyang Huanwu Decoction in the Treatment of Cerebral Infarction Complicated with Type 2 Diabetes Mellitus

Liu Lixin¹ Yuan Wulong^{2*}

(1. People's Hospital of Jia County of Shaanxi Province, Yulin China, 719299;

2. Maternal and Child Care Service Centre of Long County, Baoji China, 721200)

Abstract Objective To analyse and discuss the curative effect of Yixiao Futan Decoction and Buyang Huanwu Decoction in treating cerebral infarction with type 2 diabetes mellitus. **Method** 135 patients with cerebral infarction and type 2 diabetes mellitus admitted to our hospital from May 2015 to May 2018 were selected. All patients were given routine symptomatic medical treatment. According to random number table method, all patients were randomly divided into control group and treatment group. The experimental group was treated with Yixiao Futan Decoction, while the control group was treated with Buyang Huanwu Decoction. All patients were treated for 8 weeks. The scores of TCM syndromes of the

* 通讯作者: 袁武龙, 副主任医师。E-mail: yuanwulong123@sina.com