

脉血康胶囊治疗短暂性脑缺血发作 44 例

李小芳*

(神木市医院,陕西 神木 719300)

摘要:目的 探讨脉血康胶囊在治疗短暂性脑缺血发作中的疗效及对凝血功能的影响。方法 选取 TIA 患者 88 例,随机分为治疗组与对照组,每组 44 例,对照组患者给以常规药物抗血小板、调脂、降压等治疗,治疗组在常规药物治疗的基础上加用脉血康胶囊,观察两组患者 30 天及 3 月后临床疗效、30 天内凝血功能变化。结果 治疗 30d 内,治疗组患者总有效率为 92.86%,对照组患者总有效率为 70.5%,两组的疗效有统计学意义($P < 0.05$);两组患者凝血功能比较,PT、TT、APTT 延长,差异有统计学意义($P > 0.05$);两组患者均未出现不良反应。结论 脉血康胶囊联合常规药物明显改善 TIA 的治疗效果,且非常安全。

关键词:短暂性脑缺血发作;脉血康;疗效;凝血功能

中图分类号:R43.31 文献标识码:B 文章编号:1672-0571(2019)04-0057-03

DOI:10.13424/j.cnki.mtcm.2019.04.017

短暂性脑缺血发作(TIA)为脑或视网膜局灶性缺血所致的,未伴急性梗死的短暂性神经功能障碍,其发作时间一般持续数分钟,30min 内可以恢复,如发作时间超过 2h,则会对患者的神经功能造成损伤^[1]。根据 ABCD2 评分法可知,当患者合并高龄、控制不良的血压、糖尿病时,更易发生 TIA^[2]。由于部分患者以短暂性发作为主,患者往往因症状较重且较长时间不能缓解方才就诊,从而延误了治疗的最佳时机,导致症状进一步加重,可能遗留不同程度的并发症^[3]。且 TIA 疾病有慢性反复发作的特点,即使给以及时合理的治疗,也可能再次发作,给患者带来巨大的痛苦^[4]。脉血康胶囊具有抑制脂质过氧化、清除氧自由基功效,在脑血管疾病的临床治疗中取得显著疗效^[5]。本研究在常规西药治疗的基础上应用中成药脉血康胶囊,观察其对 TIA 的疗效及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院 2014 年 1 月~2017 年 9 月神经内科 TIA 住院患者 88 例,经医院伦理委

员会通过,所有患者签署知情同意书。随机分为治疗组和对照组,每组患者 44 例。治疗组患者男 28 例,女 16 例,年龄 50~78 岁,平均 65.6 岁,颈动脉型 TIA 24 例,椎基底动脉型 20 例,合并高血压 26 例,高血脂 29 例,糖尿病 8 例。对照组 44 例,男 29 例,女 15 例,年龄 51~82 岁,平均 64.3 岁,颈动脉型 TIA 27 例,椎基底动脉型 17 例,合并高血压 23 例,高血脂 27 例,糖尿病 9 例。2 组病例年龄、性别、TIA 类型、合并疾病情况对比,差异均无统计学意义(P 均 > 0.05)。

1.2 诊断标准及排除标准

1.2.1 西医诊断及排除标准 所有患者均符合中国短暂性脑缺血发作早起诊治指导规范的诊断标准^[6],局灶性神经功能缺损发作一次,经影像学检查排除脑出血,无活动性出血倾向,无严重肝肾功能不全、心房纤颤或严重心力衰竭。

1.2.2 中医诊断标准 采用 2008 年中华中医药学会发布中体内科常见疾病诊疗指南:本病属于中医学的“中风先兆”“小中风”范畴,符合中医辨

* 通讯作者:李小芳,主治医师。E-mail:454505916@qq.com